

# Survey sui follow up

Manuel Zorzi

Convegno Nazionale GISCI  
Firenze, 11-13 giugno 2014

# Ambiti indagati

1. Carichi di lavoro indotti dai follow up
2. Raccomandazioni dopo colpo
3. Esito dei follow up dopo colpo  
negativa
4. Esito dei follow up dopo trattamento

# Hanno partecipato alla survey


Regione	N° programmi
Emilia-Romagna	2
Lazio	7
Lombardia	1
Piemonte	9*
Sardegna	1
Sicilia	2
Toscana	2
Veneto	19
TOTALE	43

I dati sono relativi all'anno 2012


\* Compilata una sola scheda regionale

# 1. Carico di lavoro per la colposcopia


# Carico di lavoro colposcopico




# Carico di lavoro endoscopico, per Regione



# Origine delle colposcopie di follow up






# Distribuzione delle colposcopie di follow up, successive ad approfondimenti negativi per CIN2+, per esito dell'episodio di screening all'origine del follow up






# Distribuzione delle colposcopie di follow up, successive a trattamento, per diagnosi iniziale che ha indotto il trattamento






34,3%  
del totale




## 2. Raccomandazioni dopo colposcopia di approfondimento


# Dopo approfondimento negativo, con Pap ASC-US / LSIL (n=11440)




# Dopo approfondimento negativo con Pap ASC-US / LSIL, per Regione




# Dopo approfondimento negativo con Pap ASC-H / HSIL (n=1046)



# Dopo colposcopia negativa con Pap ASC-H / HSIL, per Regione




## Dopo approfondimento con esito CIN1 (n=2653)






# Dopo colposcopia con esito CIN1, per Regione



# 3. Esito dei follow up

A) Follow dopo  
approfondimento  
negativo

# VPP per CIN2 e CIN3+ dopo approf. negativo per CIN2+, per esito dell'approfondimento (%)




<b>N°</b>	5153	620	727	67	2028
-----------	------	-----	-----	----	------

# 3. Esito dei follow up

B) Follow dopo  
trattamento

# VPP per CIN2 e CIN3+ dopo trattamento, per diagnosi iniziale (%)



<b>N°</b>	217	544	1564	1970
-----------	-----	-----	------	------

# Conclusioni

- La maggioranza dell'attività colposcopica riguarda i follow up, in particolare di approfondimenti negativi dopo citologia di basso grado
- Variabilità tra programmi nelle raccomandazioni post-colposcopia
- Diverse categorie diagnostiche mostrano bassi valori di VPP al follow up
- Ampi margini di riduzione del carico endoscopico

Il rapporto completo sulla survey dei follow up è disponibile nel sito del GISCI

<http://www.gisci.it/1d-gruppo-di-lavoro>

## **Survey GISCI sulle attività di follow up dei programmi di screening cervicale**

### **Gruppo di lavoro**

Manuel Zorzi, Patrizio Raggi, Paolo Giorgi Rossi, Anna Iossa, Cinzia Campari, Laura Viberti, Marilena Amato, Angelo Baldoni, Silvano Costa, Gianpiero Fantin, Deborah French, Daniela Giorgi, Mariarosaria Giovagnoli, Tiziano Maggino, Rosanna Marotta, Nadia Martinelli, Mario Sideri, Anna Stomeo.

### **Hanno fornito i dati**

Alessandra Barca e Diego Baiocchi (Lazio), Giancarla Monticelli e Debora Canuti (Rimini), Aurora Scalisi (Catania), Valeria Caredda (Cagliari), Cinzia Campari (Reggio Emilia), Giovanni Marazza (Lodi), Maria Luisa Polo (Chioggia), Cristina Larato (Piemonte), Carmen Visioli e Anna Iossa (Firenze), Roberta Rosati (Grosseto), Chiara Fedato (Veneto)