

Convegno Nazionale GISCi



## I test di approfondimento

Orvieto 4 Aprile 2008


Stefano Ciatto  
CSPO - Istituto Scientifico  
Prevenzione Oncologica  
Firenze



**Figura 5. Proporzione di donne invitate in colposcopia (referral rate): distribuzione tra le Regioni.**  
 Survey su attività 2005.



**Figura 6.** Valore predittivo positivo (sopra) e referral rate (per citologia ASCUS+, sotto): distribuzione tra i programmi. Survey su attività 2005.



VPP di categorie di sospetto colposcopico (% biopsie) (dati ONS 2006)			
	biopsie	VPP CIN2+	CIN2+
G1	4202	20.6	866
G2	1083	73.6	797
Vasi atipici	41	70.7	29
Carcinoma	41	95.1	39



**Tabella 3.** Trattamento o gestione delle lesioni individuate da 82 programmi italiani di screening organizzato.

Tipo di trattamento	Peggior istologia prima del trattamento										
	CIN1	%	CIN2	%	CIN3	%	adenocarcinoma <i>in situ</i> (CGIN)	%	Ca invasivo	%	totale
vaporizzazione laser	110	3,8	31	2,5	6	0,4	0		0		147
escissione con radiofrequenze	258	8,9	667	54,1	752	56,3	14	22,6	8	5,7	1.699
crioterapia	0		0		0		0		0		0
conizzazione a lama fredda	25	0,9	124	10,1	228	17,1	18	29,0	16	11,4	411
escissione con radiofrequenze + laservaporizzazione	3	0,1	20	1,6	21	1,6	0		0		44
conizzazione laser	16	0,6	79	6,4	110	8,2	1	1,6	1	0,7	207
diatermia radicale (elettrofolgorazione profonda)	13	0,4	0		0		0		0		13
diatermocoagulazione	212	7,3	25	2,0	3	0,2	0		0		240
isterectomia	17	0,6	19	1,5	73	5,5	21	33,9	101	72,1	231