

Screening con HPV-TEST nella ASL2 savonese: considerazioni sul secondo round.

De Leonardis D.¹, Ardoino S.¹, Franco A.², Lualdi S.¹, Venturino E.¹

¹ASL2 Liguria S.C. Anatomia Patologica; ² ASL2 Liguria. S.C. Igiene e Sanita' Pubblica

Obiettivi

Osservare i risultati relativi al secondo round di screening (richiamo a 5 anni) con test HPV primario sul territorio della ASL2-Savonese dove non era attivo in precedenza un programma di screening organizzato con pap-test.

Metodi

- Lo screening inizia a dicembre 2011 con l'impiego del test hr-HPV ad intervallo quinquennale per le donne di età compresa tra i 30-64 anni (63.489). Dal 2017 vengono richiamate per il 2° round le donne risultate negative alla prima chiamata. In caso di test-HPV positivo è previsto il triage con pap-test. Se l'esito della citologia è negativo è indicata la ripetizione del test HPV a 12 mesi mentre in presenza di esito positivo o inadeguato è previsto l'invio a colposcopia.

Risultati

- Adesione allo screening 53,4%.
- Sono stati eseguiti negli anni 2017-2018, come 2°round, n.8878 test-HPV.
- Risultati del TEST-HPV: 466(5%) positivi e 8413(95%) negativi.
- Per i 466 casi positivi è stato esaminato il pap-test eseguito con striscio convenzionale: n.100(21%) con referto citologico inadeguato/lsil+ (non viene utilizzata la categoria ASCUS); n.366 con referto citologico negativo per le quali è stata indicata la ripetizione del test hr-HPV a 12 mesi.

Categoria diagnostica	N	%
negativi	366	78,5
inadeguato	27	5,7
LSIL	64	13,7
LSIL-H	3	0,6
ASC-H	1	0,2
HSIL	4	0,8
AGC	1	0,2
Ca squamocellulare	0	0

- Donne indirizzate alla colposcopia n.100 (1,1% delle screenate).
- L'adesione alla colposcopia è stata pari al 93% (93/100) e per 60 donne (60%) sono state praticate biopsie.
- Sono state trovate n.6/8878 CIN2+ con una DR pari 0,7 ‰ e VPP per CIN2+ pari al 6% (6/93).

Conclusioni

- Adesione soddisfacente con un trend di lieve incremento all'adesione rispetto ai dati pubblicati nel 2016: 53,4% (2018) vs 48,4% (2014). Si può speculare induttivamente nella fidelizzazione allo screening delle rispondenti.
- La positività nel 2° round al hr-HPV si abbassa: 5% (2°round) Vs 8,6% (1°round) e si assiste ad un importante decremento dei Pap-Test di triage positivi.
- Il citolettore del 2°round si trova in una condizione simile allo screening con pap-test primario in quanto la possibilità di trovare lesioni sarà molto bassa e comunque si tratterà in grande prevalenza di lesioni di basso grado come evidenziato dalla DR (da 7,7‰ nel 1°round a 0,7‰ nel 2°round).