

# Webinar GISCI

**Infezioni da HPV: persistenza e clearance**



Quale comunicazione per le donne  
HPV persistenti?

Anna Iossa

SC Screening e Prevenzione secondaria

Insieme in Toscana per capire, evitare e  
curare il cancro

[www.ispo.toscana.it](http://www.ispo.toscana.it)

Il sottoscritto Anna Iossa ai sensi dell'art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell'Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, dichiara che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario"

Quale comunicazione per le donne HPV persistenti?

Abbiamo indagato l'esperienza, le esigenze conoscitive e le problematiche comunicative delle donne con test HPV positivo

Quale comunicazione per le donne HPV persistenti?

Indagine qualitativa sulle donne con test HPV positivo al primo controllo quindi **'prima della persistenza'**

## IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno

20 interviste semistrutturate a donne  
richiamate a ripetere un test HPV 1 anno dopo  
un test HPV positivo e un Pap test negativo

Le donne erano più preoccupate della trasmissione sessuale dell'HPV che del cancro. Estremamente rilevanti erano nella percezione delle intervistate gli aspetti legati alla sessualità, con risvolti connessi alla vita di coppia.

## IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno

Frequente è stato il ricorso da parte delle donne intervistate a esami non necessari su consiglio del ginecologo. Emerge la necessità di una formazione dei ginecologi sul test HPV di screening.

Cosa sappiamo delle donne con HPV  
positivo persistente ?



Per conoscere le problematiche comunicative e le esigenze conoscitive di donne con HPV positivo persistente utile il Feedback dai colposcopisti

Sempre frequenti le domande sulla  
trasmissione sessuale

*‘quando ho preso l’infezione ?’*

Spiegare alla donna che non è possibile sapere quando è stata presa l'infezione che potrebbe risalire a molti anni prima

Non si può conoscere il momento esatto del contagio, che può risalire a molti anni prima. Si può infatti rimanere portatori del virus HPV per molti anni senza avere sintomi: una persona, cioè, non si accorge di avere l'infezione.

Tratto da : Altre informazioni sul virus HPV: informazioni approfondite per le utenti

Domande emerse in occasione delle colposcopie 'successive' quando la positività persiste da più anni....

*'cosa deve fare il mio compagno?'*

Più frequenti le domande sul rischio di  
cancro

*Siamo sicuri che se il virus rimane lì non diventa un tumore?*

..... solo pochissime delle donne che hanno il virus sviluppano una lesione. Sicuramente il sistema immunitario, il fumo e altri fattori, hanno un ruolo importante.

Tratto da : Altre informazioni sul virus HPV: informazioni approfondite per le utenti



La maggior parte delle lesioni guarisce spontaneamente, ma alcune, se non curate, possono progredire e diventare tumori. Questo però è un evento molto raro e richiede generalmente molti anni.

Tratto da : Altre informazioni sul virus HPV: informazioni approfondite per le utenti

Dare informazioni rassicuranti sulla storia naturale della malattia sottolineando la lenta progressione che consente diagnosi e terapia di lesioni eventualmente insorte nel percorso di sorveglianza

..... è importante tenere sotto controllo tutte le lesioni e trattare solo quelle al di sopra di una certa gravità. Infatti le complicanze, dopo i piccoli interventi utilizzati per trattare queste lesioni, sono rare ma esistono.

Tratto da : Altre informazioni sul virus HPV: informazioni approfondite per le utenti

*Ci possono essere problemi per la gravidanza?*

finora non è stato dimostrato alcun rischio per il bambino. Se durante la gravidanza le trovassero delle lesioni del collo dell'utero, potrà tenerle sotto controllo , e rimandare la terapia dopo il parto

Tratto da : Altre informazioni sul virus HPV: informazioni approfondite per le utenti

Comunicare con donne 'trattate' per  
l'HPV persistente

l'impatto emotivo generato dalla  
persistenza della positività del test HPV  
spinge le donne a trovare 'una cura'

*Perché il virus dopo la bruciatura  
non se n'è andato?*

*Ho fatto la terapia medica, ho speso un sacco di soldi ma il virus non è andato via*



*Ho fatto il vaccino e sono ancora positiva !*

Spiegare che il virus non si cura e che invece si curano le lesioni indotte dal virus .

Preparare le donne al fatto che 6 mesi dopo il trattamento di lesioni CIN2/3 il test HPV è ancora positivo in circa il 20% dei casi

*La 'stanchezza' delle donne con HPV  
persistente da anni.*

*Dottorressa io non vengo più a fare i  
controlli...*

Il ginecologo deve da una parte  
tranquillizzare e dall'altra spiegare  
l'importanza di continuare a fare i  
controlli.....

## *Cos'altro posso fare ?*

Se fuma deve sapere che il fumo di tabacco è un importante fattore di rischio per le lesioni pretumorali e per il tumore del collo dell'utero, quindi è fondamentale smettere di fumare.

Dare informazioni sugli aspetti critici  
come la trasmissione sessuale, il rischio  
di cancro e la mancanza di cura  
dell'infezione



sottolineare l'importanza di rimanere nei  
protocolli di sorveglianza dello screening

Cogliere l'occasione per dare un  
messaggio sui corretti stili di vita (fumo)

Grazie per l'attenzione!

[a.iossa@ispro.toscana.it](mailto:a.iossa@ispro.toscana.it)