

Gentile Collega,

ti scriviamo per informarti sulle novità riguardanti lo screening del tumore del collo dell'utero in Toscana. In seguito ad una delibera della Regione Toscana del dicembre 2012, il test di screening per le donne nella fascia d'età 35-64 anni cambierà e il Pap test gradatamente sarà sostituito dal test per la ricerca di ceppi ad alto rischio oncogeno per Papilloma virus umano (test HPV). Questo cambiamento epocale è supportato dai risultati della ricerca scientifica che si è avvalsa di numerosi trial randomizzati. La Toscana ha partecipato a uno dei più importanti attraverso il coordinamento dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione oncologica (ISPO). Per le donne tra i 25 e 34 anni il Pap test continuerà ad essere il test di screening perché in questa fascia il Pap test si è dimostrato ancora il test di screening ottimale. Le evidenze sull'efficacia del test HPV come test di screening primario sono riportate in un documento tecnico di sintesi delle evidenze pubblicato nei quaderni di Epidemiologia e Prevenzione (<http://www.epiprev.it/pubblicazione/epidemiol-prev-2012-36-3-4-suppl-1>)

In sintesi, i principi fondamentali da seguire affinché un programma con test HPV sia efficace sono:

- 1) utilizzare un test HPV validato per lo screening
- 2) effettuare il test HPV solo nell'ambito di un programma di screening organizzato e quindi monitorato
- 3) seguire protocolli appropriati di gestione delle donne risultate positive al test

Il nuovo protocollo dello screening basato sul test HPV prevede che la donna effettui un doppio prelievo, uno per il test HPV e uno per il Pap test, che sarà letto però solo se il test HPV risulterà positivo. Le donne risultate negative al test saranno invitate a ripetere il test dopo 5 anni. Tale intervallo è stato dimostrato essere sicuro; infatti, il numero di lesioni identificabili dopo 5 anni di intervallo da un test HPV negativo sono minori di quelle identificabili dopo un intervallo 3 anni da un Pap test negativo. Nelle donne risultate positive al test HPV la lettura del Pap test avrà la funzione di selezionare quelle da inviare all'approfondimento di secondo livello (test di triage). Infatti le donne risultate positive al test HPV ma con un Pap test negativo saranno invitate a ripetere il test HPV dopo 1 anno, mentre le donne con citologia anormale saranno invitate a fare una coloscopia.

La sfida maggiore nell'adozione di questo protocollo risiede nelle problematiche comunicative destinate dall'HPV che riguarda due ambiti molto critici, le malattie sessualmente trasmesse da una parte e il rischio di cancro dall'altra. Per questo motivo, da anni il gruppo italiano di lavoro sullo screening del carcinoma della cervice uterina (GISCI) si occupa di questa tematica producendo e aggiornando un materiale informativo sull'HPV destinato ad utenti e agli operatori (le 100 domande sull'HPV)

[www.gisci.it/documenti/documenti\\_gisci/100d\\_hpv\\_2011.pdf](http://www.gisci.it/documenti/documenti_gisci/100d_hpv_2011.pdf).

Riteniamo che il tuo ruolo sia fondamentale per le donne per garantire una loro partecipazione consapevole e informata ed aiutarle a meglio comprendere le peculiarità di questo screening. In particolare, è importante la tua collaborazione per far sì che il test HPV sia utilizzato in modo appropriato sulla base delle evidenze scientifiche e non comporti per la donna un danno invece che un beneficio.

Per avere ulteriori informazioni puoi leggere la prossima pubblicazione su questo argomento che comparirà su Toscana Medica, oppure puoi scrivere a noi ([a.iossa@ispo.toscana.it](mailto:a.iossa@ispo.toscana.it) - [alessio.nastruzzi@tiscali.it](mailto:alessio.nastruzzi@tiscali.it)) o alla responsabile del progetto regionale di implementazione del programma con test HPV Dott.ssa Francesca Maria Carozzi ([f.carozzi@ispo.toscana.it](mailto:f.carozzi@ispo.toscana.it)) .

Ringraziandoti in anticipo per la tua preziosa collaborazione

Cordiali Saluti

Dr.ssa Anna Iossa

Responsabile Organizzativo  
Programma di Screening  
tumore del collo dell'utero



Dr. Alessio Nastruzzi

Referente MMG

